

一個吸毒女孩的心路歷程...

在吸毒的日子裡，毒品就是
生命的全部，一秒也離不開



外表還美麗的我



為了生活走上了街頭



在夜的掩護下，我在尋找著獵物



早晨醒來的第一件事是吸毒



毒隱讓我忘記了所有的
尊嚴，甚至是身體！



吸毒讓我的手腐爛



讓我染上了性病，但是
沒有辦法



毒隱來了，疼痛難忍

吸毒讓我骨瘦如柴，女人
吸毒，再大的眯眯也會...
癢



但我無法停止



毒隱來了，我控制不了我自己



為了毒品，我可以把我賣給任何一個人，只為了換來這一點白白的東西，我付出很多代價



我終於進了禁毒所，以下就
是禁毒所的生活了



現在我唯一的希望就是戒
掉毒隱，從新生活 我希望
我的遭遇能夠給大家忠告
吧 遠離毒品，珍惜生命！



end



你還敢嘗試...毒品嗎？！



為什麼對孩子們未來為害最烈是毒品？

生活知能欠缺、學習成就低落、品格教育不佳

都還有轉變成功的可能

毒品

不能及時回頭、徹底斷根
不但毀掉自我、越陷越深
國家社會資源，隨之耗弱

● 空洞眼神

【來源—國家地理雜誌】

藥物濫用現況說明－新聞現場





新聞直擊（今年新聞）

- ◎ 學生毒來毒往 視為「禮」所當然
- ◎ 無法可管 歡場歌坊拉K成風
- ◎ 醫專學生賣K 毒害遍及鄰校
- ◎ 懷疑孩子吸毒 7成驗出K他命
- ◎ 警方破獲販賣K集團 主嫌是高職生
- ◎ 幫派以毒品控制學生擴充惡勢力
- ◎ 毒梟利誘兼餵毒 4學生煉億元K他命
- ※ 拿K他命減肥 年輕人差點洗腎
- ◎ 國二女藥頭 批發K他命



以下將介紹各類毒品
及相關罰則





罌粟

- 來源：以印度與土耳其為兩大主要產地；亞洲方面，以中國泰國、寮國、緬甸邊境的金三角為主要非法種植地區。
- 濫用方式：莖幹及葉含少量生物鹼，成熟枯乾後切成菸草吸食；未成熟蒴果割裂取其乳汁，乾燥凝固成鴉片後以附煙袋鍋之長管抽吸，未割裂蒴果成熟後乳汁自行凝固於果殼成為鴉片之原體。





一年生或二年生草本，花單一頂生型而美麗，花瓣四片，白色、淡紅或紫紅，果實為蒴果呈卵狀球形或長橢圓形；種子不含嗎啡。



鴉片



- 來源：罌粟未成熟蒴果經割傷果皮後，滲出之白色乳汁乾燥凝固而得。含鴉片生物鹼約25種。
- 濫用方式：以附煙袋鍋之長管抽吸。
- 毒害：使用初有欣快感，無法集中精神，會產生夢幻現象。過量使用造成急性中毒，症狀包括昏、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。具高度心理及生理依賴性，長期使用後停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗、流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。一旦成癮極難戒治。






嗎啡



- 來源：由鴉片提煉的一種鴉片生物鹼。
- 濫用方式：口服、抽吸、鼻吸或注射。
- 毒害：使用初有欣快感，無法集中精神，會產生夢幻現象。過量使用造成急性中毒，症狀包括昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。具高度心理及生理依賴性，長期使用後停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗、流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。一旦成癮極難戒治。



一級毒品-嗎啡




圖七 嗎啡

嗎啡(白粉)：是由鴉片提煉的一種鴉片生物鹼。具鎮痛及催眠作用。具光澤無臭味苦之極微細白色針狀結晶粉末。通常裝入小紙如包藥般包裝或以封口塑膠帶方式流通市面。

濫用方式：口服、抽吸、鼻吸或注射。白色粉末服用，參入香煙吸入或加上美達水、蒸留水、靜脈注射。

毒害：長期使用後停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。一旦成癮極難戒。







海洛因

- 來源：源於鴉片，由嗎啡經乙醯化改變構造而得。
- 濫用方式：口服、抽吸、鼻吸或注射。用口吸入 煙霧稱追龍。
- 毒害：使用初有欣快感，無法集中精神，會產生夢幻現象。過量使用造成急性中毒，症狀包括昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。具高度心理及生理依賴性，長期使用後停藥會發生渴求藥物、不安、流淚、流汗、流鼻水、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。一旦成癮極難戒治。





一級毒品-海洛因

海洛因：大量使用引起精神錯亂思想障礙，長期使用引起失眠、躁動或妄想性神經病。



圖八 海洛因磚

源於鴉片，是由無水醋酸與嗎啡加熱反應而來，其毒性為嗎啡10倍。
白色結晶粉末，街頭流行之品種純度不一，由淺棕色至白色；亦有混雜奶粉、糖或葡萄糖等物質。
依純度不同而以一號、二號、三號、四號、海洛因區分。
濫用方式：口服、抽吸、鼻吸或注射。



古柯鹼



- 來源：由古柯葉提煉而得，哥倫比亞、祕魯、玻利維亞、古巴為主要產地。美國及中南美洲為主要濫用地區。
- 濫用方式：鼻吸、吸煙。
- 毒害：使用後產生興奮、發抖、心跳加速、血壓上升、被害妄想、幻覺。大量使用引起精神錯亂思想障礙，長期使用引起失眠、躁動或妄想性神經病。過量引起呼吸抑制。停藥之脫癮症狀與安非他命類似，包括精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁不安、憂鬱，有自殺的傾向。





一級毒品-古柯鹼



圖十 古柯鹼



使用後產生興奮陶醉之狀態、發抖、心跳加速、血壓上升、被害妄想、幻覺。大量使用引起精神錯亂思想障礙，長期使用引起失眠、躁動或妄想性神經病。

古柯鹼：由古柯葉提煉而得，屬於中樞神經興奮劑，為無色或白色薄片狀結晶性粉末或塊狀，味苦，具舌麻痺感，又稱為可卡因。



三級毒品-FM2



FM2強姦藥丸有的錠劑上打印**FM2**字樣及十圖案，俗稱十字架。

毒害：為強力安眠藥，迅速誘導睡眠，具心理及生理依賴性。過量使用會引起嗜睡、注意力無法集中、神智恍惚及昏迷現象，並造成反射能力下降、運動失調、頭痛、噁心、焦躁不安、性能力降低、思想及記憶發生問題、精神紊亂、抑鬱等情況。



大麻



- 名稱及種類大麻是一種迷幻劑，俗稱「草」或HASH，英文阿為Cannabis，是由一種學名稱Cannabis Sativa的植物提煉而成，內含白消安及四氫大麻酚。經製煉後的大麻主要有三種形式
- 1. 大麻草：由晒乾的花和葉製成，呈灰綠色或啡綠
- 2. 大麻膏：由大麻樹脂煉而成，呈淺啡色塊狀
- 3. 大麻油：由大麻樹脂提煉出來，呈墨綠色或啡綠







二級毒品-大麻



圖十一 大麻樹、葉

大麻：莖直立，密生細柔毛，掌狀深裂複葉，互生具長葉柄，莖下部葉對生，小葉3~9枚，披針形先端漸尖邊緣粗鋸齒。



圖十三 大麻種子



二級毒品-大麻

大麻：使用初有欣快感，劑量增加會引起懶散、意識混亂、無方向感、時扭曲、動作協調差、記憶、思考、注意力、判斷力下降。

濫用方式：吸煙或煙斗抽吸。



圖十二 大麻成品



圖十四 大麻膏





安非他命




- **來源：**由鹽酸麻黃素合成。國內濫用之安非他命主要為甲基安非他命。
- **毒害：**興奮中樞神經，雖具有欣快、警覺及抑制食慾之作用，重複使用會成癮，中毒症狀包括多話、頭痛、錯亂、高燒、血壓上升、盜汗、瞳孔放大、食慾喪失。大劑量使用引起精神錯亂，思想障礙，類似妄想性精神分裂症，多疑、幻聽、被害妄想等，長期使用導致器官性腦症候群。有高血壓及腦中風之危險。停用之脫癮症狀包括精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁不安、憂鬱，有自殺之傾向。





二級毒品-安非他命



圖二十二 安非他命

安非他命：大劑量使用引起精神錯亂，思想障礙，類似妄想性精神分裂症，多疑、幻聽、被害妄想等，長期使用導致器官性腦症候群。有高血壓及腦中風之危險。

圖1

停用之脫癮症狀包括精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁不安、憂鬱，有自殺之傾向。



圖二十三 安非他命錠劑

圖2





搖頭丸(MDMA)

- ◎ 結構類似安非他命之中樞神經興奮劑
(具幻覺作用的興奮劑)
- ◎ 俗稱忘我、亞當、狂喜、
快樂丸、搖頭丸。
- ◎ 常見的包括白色藥片，
紅色(白色)膠囊或粉末形式





中樞神經興奮、幻覺劑

搖頭丸 (MDMA)

- 施用方式：口服
- 作用：
 - 口服後會有愉悅、多話、情緒及活動力亢進、產生一種人際間強烈的親近感等行為特徵。
 - 服用後約二十分鐘至一小時會產生作用，濫用效果約可持續數小時。
 - 服用後在興奮之餘，還會產生食慾不振、不隨意牙關緊閉、肌痛、噁心、運動失調、盜汗、心悸、倦怠及失眠等症狀。



二級毒品-MDMA



藥丸上英文
字母不一，
通常為製造
者代號

圖二十 MDMA

MDMA搖頭丸：引起之毒性包括體溫過高、血管疾病、心律不整致命的毒性包括橫紋肌溶解散布性血管內凝集及急性腎衰竭

與安非他命及古柯鹼同，會產生心理依賴造成強迫性使用，引致抑鬱及精神錯亂，亦時有惶恐不安感，甚至自殺之傾向



中樞神經興奮、幻覺劑

搖頭丸 (MDMA)

不良作用：

肌肉緊張、不隨意牙關緊閉、嘔吐

增加心跳、血壓上升

混淆不清、抑鬱、睡眠障礙、焦慮、渴求藥物

幻覺、視力模糊、眼球不自主轉動、寒顫或流汗

長期使用除會產生心理依賴，強迫使用外，還會造成神經系統長期傷害，產生如情緒不穩、視幻覺、記憶減退、抑鬱、失眠及妄想等症狀。



中樞神經興奮、幻覺劑



搖頭丸 (MDMA)

不良作用：

對身邊眾人產生博愛世人的溫暖

自我控制能力減弱，易與人親近，較不害羞，易發生危險性行為；加上易產生不會受到傷害的幻覺，服用者可能會對自身行為安全掉以輕心，而造成意外傷害。

濫用者若在擁擠、高溫的空間下狂歡勁舞，常會因運動過度導致缺水，產生體溫過高（可高達43度）、痙攣，甚至併發肌肉損傷、凝血障礙及急性腎衰竭而導致死亡。





三級毒品-FM2



FM2強姦藥丸有的錠劑上打印**FM2**字樣及十圖案，俗稱十字架。

毒害：為強力安眠藥，迅速誘導睡眠，具心理及生理依賴性。過量使用會引起嗜睡、注意力無法集中、神智恍惚及昏迷現象，並造成反射能力下降、運動失調、頭痛、噁心、焦躁不安、性能力降低、思想及記憶發生問題、精神紊亂、抑鬱等情況。



俱樂部濫用物質

- 俱樂部：

指PUB、舞會、舞廳、Rave Party、夜總會、酒吧、網咖或私人聚會、場所

- 濫用的物質：

包括菸、酒、搖頭丸、FM2、K他命、GHB、(甲基)安非他命、搖腳丸(LSD)大麻、魔菇和笑氣等。





磨菇



Copelandia tropicalis
photo by John W. Allen



兜比維





嗑花一族

快感 and 死亡經常只是一線之隔

嗑花的危險性太高，要達到迷幻作用的劑量，也差不多是中毒劑量，迷幻不成反會送命。

迷幻作用所造成的神智不清，會對時空認知產生誤差。



笑氣 N2O







檢出 2C-C, 2C-I

94051563, 管制藥品管理局





雞尾酒嗑法 簡直不要命

多種藥物混用成新歪風 醫師警告嗑單一毒品就可能送命

【記者洪素卿／台北報導】多種藥物混用，已成為近年毒品濫用新風潮，嗑藥族鼓勇嘗試各種藥物排序組合混用的快感。

但醫師警告，單一毒品一顆就可能要命，至於混用趨勢，更加提升致命風險。

林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑表示，「樂極生悲」的毒品致命事件，近年屢見不鮮；要命的是，送命者沒有特定高危險群，「只要嗑藥，就可能因毒送命」。

「不要以為自己過去幾年嗑藥都沒出問題，就不會淪為吸毒猝死一族！」林杰樑說，一名服用搖頭丸已經有

一、兩年經驗的十九歲年輕男子，吃了一顆K他命外加一顆搖頭丸，在舞池卅分鐘狂歡熱舞後，就出現意識不清、高燒抽搐的症狀，最後併發多重器官衰竭，一天半之後，一命嗚呼！

「也有人第一次使用違禁藥品，就此送命」，林杰樑舉例，曾有一個廿二歲的青年，在聖誕節前夕與朋友前往PUB狂歡。在吧檯前，有人向他們兜售搖頭丸，他們花五百元買兩顆試試，才吃了一顆，跳兩下舞，當就不省人事，送醫後幾小時，就因重要器官全告衰竭而猝死。

這名青年是第一次吃搖頭丸，被送到醫院時已出現「

毒上加毒 拉K無法管 摻毒更天壽

不肖毒販混加其他毒品 加強毒效深化毒癮罔顧人命

【記者李榕宏／桃園報導】桃園縣警方指出，K他命在國內屬二級毒品，目前法律對K他命，僅處罰「販賣、製造」的行為，至於「持有、吸食」則未科處刑責，這造成青少年有恃無恐地濫用吸食；許多不肖毒販乾脆將「甲基安非他命」或「潘他啞新」等毒品摻入K他命，加強毒效並深化青少年的毒癮，同時藉以逃避取締，害人匪淺。

桃園縣各地警方最近查獲十多件毒品案，都是在K他

命粉末內摻入其它毒品，主要多是甲基安非他命、潘他啞新等二級毒品，少數則摻有海洛因一級毒品；因販毒者以K他命的外貌販售，青少年誤以為是「一般K他命」失去戒心，稍有不慎，極易「吸毒過量猝死」。

警方指出，青少年「拉K」常用兩種方式，有的將K他命粉末均勻散布在桌上，用小紙片切割成細條狀，再以特製短吸管直接吸入鼻孔內，這種方式常見於電影情節；另一種是摻入香菸的菸草中，俗稱「K菸」，也非

橫紋肌溶解」現象，不但尿液都已變成可樂般的咖啡色，還有急性腎衰竭及尿毒症狀，體溫更高達攝氏四十點七度。

林杰樑說，這些個案多半是死者對藥品產生特異性反應。

近年來，藥頭為吸引毒蟲，常在搖頭丸等違禁藥品中加入不明成分。

林杰樑說，普拿疼、FNI、肌肉鬆弛劑、安非他命，都成為違禁藥品添加劑，除了可能導致各種藥品交互作用，一團混亂外，在提煉過程中，一些因純化技術不佳導致成分不純的化學藥品，也都可能致命。

振興醫院精神科醫師則說，混用中樞神經興奮劑、麻醉劑、鎮靜劑，藥物在同一時間內進入腦部的多巴胺系統、血清素系統，加上麻醉作用，等於是挑戰人體「危機處理」能力，使腦部暴露在多重危險之中。

臨床上常見混用藥物者，出現麻痺、呼吸困難、意識混亂等現象，短期失憶事小，有人還會自傷、暴力，甚至因而猝死，性命不保。

秘密。

警方感嘆，因「拉K」不犯法，致青少年有恃無恐，以K他命為踏入吸毒的「第一步」，有些青少年「拉K」遇警臨檢時，還態度囂張地反問警方「拉K犯法嗎」？令警方氣結。

緝毒經驗豐富的資深刑警指出，青少年爭相「拉K」，量愈吸愈多，毒癮也愈來愈大，許多不肖毒販利用「拉K族」吸再多K他命也不夠過癮的弱點，在K他命內摻入其它毒品，一方面滿足青少年的毒癮，免得被其他毒販拉走客人，且摻入其它毒品後售價抬高，獲利更多。

警方說，毒販將毒品摻入K他命內，還藉此逃避警方取締，因為摻入K他命的其它毒品，外觀上仍是利用K他命的小瓶罐包裝，即使被查獲也可辯稱「持有、吸食K他命不犯法」，除非警方全數查扣、逐罐檢驗成分。



非尿液檢體檢驗結果圖




檢出大麻成分



檢出搖頭丸(MDMA) 成分



檢出噻他命(Ketamine)、Barbital 成分



檢出 Dextrose、Methamphetamine 成分



檢出 Methamphetamine、MDMA、Caffeine 成分



檢出 Methamphetamine、Phenacetin、Caffeine、Ketamine、Diazepam 成分





吸食多元化






常見 LSD 之外觀



LSD (搖腳丸 一粒沙)



中樞神經迷幻劑


神奇蘑菇



Psilocybe arcana
Photo by Jan Borovicka, © 2002 Erowid.org



Psilocybe cubensis
photo by Shroom Wizard



Copelandia cyanescens
photo by John W. Allen





FM2

Ketamine



GHB

約會強暴丸



約會強暴丸 (*Date Rape Drugs*)



- 中樞神經抑制劑
- 通常無色、無臭、無味加入飲料後不易被察覺
- 暫時性失憶症(被害者舉證困難)







93.2.4. 聯陸 迷姦藥 變身泡麵咖啡包

網路販售 偽裝成知名品牌 藥管局：業者無法無天 將送警偵辦

【記者李樹人/台北報導】

「迷幻咖啡包」、「迷魂阿華田」、「偽裝型碗麵」，不肖業者最近在網路上出售這些包裝維妙維肖的迷姦藥品，一碗迷姦泡麵索價1000元，業者聲稱只要吃半碗，就有催情效果。

泡麵、阿華田、奶球、糖包、三合一咖啡包等食品，現在都成了不肖人士包裝迷姦藥物FM2的最佳商品，網頁上還清楚寫著「本品僅供情侶使用，其他用途本網概不負責」等字樣。

以三合一咖啡包為例，某知名品牌咖啡成了迷幻咖啡包，業者表示，完全沒有異味，服用約20分鐘以後，會直接刺激性神經產生生理欲望的催情作用，30分至40分鐘之後求歡，可以說是百無一失，手到擒來，對方醒來完全沒有記憶。

在眾多迷情商品中，以碗裝泡麵最難察覺，每碗售價1000元，被業者列為「玩家級」，屬於最新型偽裝產品，功效強大驚人，食用15分鐘內就會陷入昏睡，入眠之後，服

用者不會受到外力干擾，怎麼吵、怎麼動，都不會醒來。

【記者李樹人/台北報導】

網路上出現咖啡隨身包、泡麵等加工強姦藥物，衛生署管制藥品管理局長李志恆提醒民眾，最好不要隨便吃陌生人給的東西，就連現泡的咖啡、可可，甚至是泡麵，也不要碰。

偽裝型碗麵



迷幻咖啡包



不肖業者在泡麵添加迷姦藥品，聲稱只要吃半碗就會「茫酥酥，不省人事，想怎樣就怎樣」。

(摘自網站)

李志恆也憤怒地說，這些業者簡直無法無天，為了賺錢，罔顧民眾健康，如果藥效真的如此強大，將

知名品牌的三合一咖啡，成為不肖人士製造迷姦藥品的工具，一包迷幻咖啡包售價680元，業者聲稱喝下之後只要幾十

分鐘，就能「為所欲為」。(摘自網站)

危及不少女性安危，管制藥品管理局將蒐集資料，交由刑事警察局偵辦。



交流道

Communication






...管，降低犯罪及強力掃除販毒。
 反毒失控是全世界的問題，很多國
 比我們嚴重，目前可以考慮「吸
 除罪化」。部份醫師提出「把毒癮當
 對症下藥」，在歐美某些地區，有
 家開放給吸毒者在醫師監視下吸
 例如在荷蘭，政府派車定時定點，
 毒者來解癮，毒犯必須事先登記，
 「戒毒卡」才能施打，這樣方能控

目前台灣毒品影響治安的狀況已不
 堪，可考慮以「另類思考」的辦
 容忍現有毒犯有條件地吸毒，但必
 有效控管為前提，準備各項戒除、
 計畫等配套措施，以免造成管理上
 的困難。

台灣的衛生所遍布各地，設備及人

▼鼓勵戒毒更生機會，可以阻絕毒梟，斷絕毒瘤，犯罪率自然降低，
 治安環境漸趨穩定，整體而言是國家、社會之福。



3210	7770837	偵查
3212	7770837	第六
3216	7761528	第六
3217	7766365	第六
3235	7751013	第七
3238		偵查
3242		偵查
3249	7760329	偵查
3250		偵查
3251		裁決
3253		警備
3267	7761528	警備
8268		警備
2338	7692964	檔案
2339	7692304	留置
2340	7692082	駐區
3224	7775405	芳苑
3226	7772118	芳苑
3227	7772119	大城
3228	7775565	竹塹
3230	7704441	二林
3231	7792048	草湖
3232	7713404	漢寶
3233	7711934	王功
3237		路上
3239		西港
3252		永安
		原斗
		萬興
		漢寶
分局		
3300	8850003	
3301	8850003	北
3302	8811384	
3304	8852026	局長
3305		分局
3307	8852026	副分
3308	8824439	勤務
3353	8824439	勤務
3354		勤務
3370	8824493	第一組
3309	8824438	第一組
3355	8824438	第一組
3356		第二組
3313	8850148	第二組
3358	8850148	第二組
3359		第三組
8314	8819062	第三組
3365		第三組
3306	8850149	第四組


四級毒品中常見品項表-毒品危害防制條例



第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
<ul style="list-style-type: none">▪ 鴉片▪ 嗎啡▪ 海洛因▪ 古柯鹼	<ul style="list-style-type: none">▪ 安非他命▪ 甲基安非他命▪ MDMA(搖頭丸)▪ 可待因▪ 配西汀▪ 美沙冬▪ 吩坦尼▪ 大麻▪ LSD (搖腳丸)	<ul style="list-style-type: none">▪ K他命▪ FM2▪ 小白板▪ 紅中▪ 青發	<ul style="list-style-type: none">▪ Zopiclone▪ Zolpidem▪ Nimetazepam▪ Oxazepam▪ Alprazolam▪ Barbital



毒品進入人體流程圖





毒品危害防制條例相關罰則

行為	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
1. 製造 運輸 販賣	死刑或 無期徒刑 (一千萬元以下)	無期徒刑或 七年以上 (七百萬以下)	五年以上 (五百萬元以下)	三年以上 十年以下 (三百萬元以下)
2. 意圖販賣 而持有	無期徒刑或 十年以上 (七百萬以下)	五年以上 (五百萬元以上)	三年以上 十年以下 (三百萬元以下)	一年以上 七年以下 (一百萬元以下)
3. 強暴脅迫 欺瞞或非法方法使人施用	死刑、無期徒刑或十年以上 (一千萬元以下)	無期徒刑或 七年以上 (七百萬以下)	五年以上 (五百萬元以下)	三年以上 十年以下 (三百萬元以下)

毒品危害防制條例相關罰則



行為	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
4. 引誘他人施用	三年以上 十年以下 (三百萬元以下)	一年以上 七年以下 (一百萬元以下)	六月以上 五年以下 (七十萬元以下)	三年以下 (五十萬元以下)
5. 轉讓	一年以上 七年以下 (一百萬元以下)	六月以上 五年以下 (七十萬元以下)	三年以下 (三十萬元以下)	一年以下 (十萬元以下)
6. 施用	六月以上 五年以下	三年以下		
7. 持有	三年以下或罰金 (五萬元以下) 查獲者均予沒入銷毀	二年以下或罰金 (三萬元以下) 查獲者均予沒入銷毀	無正當理由不得擅自持有，查獲者均予沒入銷毀	無正當理由不得擅自持有，查獲者均予沒入銷毀



初次使用 / 成癮的原因

■ 初次吸毒的原因

■ 好奇居首

■ 朋友邀約

■ 消除生活壓力

■ 變成習慣的原因

■ 不用會身體不適

■ 無聊打發時間

■ 心理渴望用藥





成癮傾向的嚴重度--女性>男性

- 初用物質年齡低
- 多重複雜物質濫用史
- 使用高成癮物質
- 早期受虐經驗
- 與家人關係疏離
- 工作與生活史較複雜
- 受控





藥物濫用者常有特徵

- 精力旺盛、不易疲倦，或神智不清，無精打采，行動呆滯，步履不穩，無意義的重覆動作，情緒上出現焦躁不安、易怒、精神恍惚、注意力不集中。
- 藏有來源不明的藥品、吸食器具(如注射器、酒精燈、棉球)。
- 皮膚上有針孔。





吸毒的害處

毒品會對腦中樞神經造成影響，吸毒者為達到預期的效果，往往需要反覆增加使用量，常常會在不知不覺的情況下過量使用，造成中毒現象，依賴毒品。終止或減少使用毒品，身體即會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等戒斷症狀。





- 吸毒成癮者在持續使用毒品的情況下，極難戒絕，終其一生難以擺脫毒品的束縛。除了會嚴重影響個人健康外，還會面臨失業、求職不易、朋友疏離、婚姻破裂、家庭破碎、自尊受創，而無法適應社會，甚至不惜以暴力或偷竊等不正當的手段謀財，以設法取得毒品，造成嚴重的社會問題





拒絕毒品的方法

- 拒絕不良嗜好
- 建立舒緩壓力、情緒的正當方法
- 建立正確用藥觀念
- 遠離是非場所
- 提高警覺不隨便接受陌生人之飲料、香煙
- 培養健康正當休閒活動
- 建立自信及自尊心





我的朋友在吸毒， 他犯法了嗎？

- 吸毒、販毒都觸犯刑法都會坐牢的，情節重大者甚至終身將在監獄裏度過。但是為了幫助這些迷途羔羊，只要在被查獲以前自動向有關單位報請勒戒，司法單位將會視其為病人，僅給予毒癮戒治而不予懲處；若不自動戒治一旦查獲將遭受嚴懲。





毒癮可能戒掉嗎？

- 毒癮之醫療戒治並不困難，重要的是毒癮的心理戒治費時又費力且成效有限。一旦拒毒心防潰決，癮者容易因再度遭受挫折而受誘再犯，造成「身癮易除而心癮難去」之窘境，所以最保險的方法就是堅決拒絕毒品。若不幸染上毒癮，要找專業人員協助，靠著堅強的意志力，還是有可能戒除。



大家一起來反毒



要如何幫助他？

國內目前有很多藥物濫用諮詢及輔導機構，也有很多醫療機構參與戒治工作

毒品的諮詢及輔導機構

- (一) 行政院衛生署藥政處 (02)23210151。
- (二) 行政院衛生署麻醉藥品經理處 (02)23952279。
- (三) 中華民國反毒運動促進會 (02)23895995。
- (四) 財團法人基督教晨曦會 (02)29270010。
- (五) 全省各地衛生局、張老師、生命線。



大家一起来反毒



- 毒品危害防制中心提供以下有關毒品問題的各項服務：
認識毒品的危害、電話諮詢、心理諮商、法律諮詢、
轉介醫療院所或宗教團體戒毒、協助就業、職業訓練、
社會補助、愛滋病篩檢、參與減害計畫、預防犯罪宣
導、家庭重建等等。如果您或您的家人有跟毒品相關
的困擾，可以撥打當地的毒品危害防制中心專線服務，
就可以幫助您或您的家人解決這些問題。

彰化縣毒品危害防制中心



04-7115141



員林分局偵查隊

04-8325000





報告完畢，心得分享

